

ਅਕੈਮਪੋਸੇਟ (ਕੈਂਪੂਲ)

ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕੈਮਪੋਸੇਟ ਇਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਤਵੇਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?:

- ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਡੀਟੋਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਅਕੈਮਪੋਸੇਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖੇ (ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ) ਮੁਤਾਬਕ ਅਕੈਮਪੋਸੇਟ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਅਕੈਮਪੋਸੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਫੀ (ਸੋਬਰ) ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
- ਨਾਲਟ੍ਰੈਕਸੋਨ ਨਾਲ ਅਕੈਮਪੋਸੇਟ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕੈਮਪੋਸੇਟ ਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਮਦਦ ਸਮੂਹ) ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕੈਮਪੋਸੇਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਵਰੇਜ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ (ਇਨਸ਼ੂਰੈਂਸ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਸਿੱਧੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ:

- ਅਸਿੱਧੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ: ਪੇਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਦਸਤ, ਉਲਟੀ, ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ)।
- ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ, ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ।
- ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ: ਆਤਮ-ਘਾਤਕ ਫੁਰਨੇ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਕੈਮਪੋਸੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ?

- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਜਿਗਰ (ਲਿਵਰ) ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ।
- ਅਕੈਮਪੋਸੇਟ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਂ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਮਪੋਸੇਟ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਮਾਤਰਾ:

- ਅਕੈਮਪੋਸੇਟ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 - ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ 2 ਗੋਲੀਆਂ (666ਮਗ) ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 2000 ਮਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ 1 ਗੋਲੀ (333 ਮਗ) ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 1000 ਮਗ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖਤਰੇ:

- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਅਕੈਮਪੋਸੇਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕੈਮਪੋਸੇਟ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।

ਲਾਗਤ:

ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਮਾਂ (ਇਨਸ਼ੂਰੈਂਸ) ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।